

## ○亜鉛華軟膏【外】

【重要度】 【一般製剤名】酸化亜鉛 zinc oxide 【分類】収斂・消炎・保護剤

【単位】〇g

【用法】1日1～数回患部に塗布

【特徴】酸化亜鉛（200mg/g）の収斂、消炎、保護、緩やかな防腐並びに浸出液吸収性を持ち、更に皮膚軟化性及び皮膚密着性を有する。これらの作用により、痂皮を軟化し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を速やかに改善する。外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症等の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面に使用

【主な副作用・毒性】過敏症、発疹、刺激感

【MW】81.39（酸化亜鉛）

【備考】眼には使用不可

【更新日】20150818

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。