

△防己黄耆湯エキス顆粒 (20) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/日

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 虚症の水毒を治す方剤。肥満症、関節痛、むくみ（水太り）に適応症がある。下肢に浮腫があり、膝関節が潮腫して痛む場合に用いられ、変形性膝関節痛に適用されることがある。腎内の PGI₂ 及び TXA₂ 産生のバランスを PGI₂ 優位にすることにより尿蛋白抑制作用を示すものと示唆されている。

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症、間質性肺炎、肝障害

【更新日】 20220224

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。