

◎防風通聖散エキス顆粒 (62) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 高血圧に伴う動悸・肩こり・のぼせ、肥満症、むくみ、便秘に対して用いる。

【主な副作用・毒性】 間質性肺炎、偽アルドステロン症、肝障害

【備考】 甘草を含むので低カリウム血症や血圧上昇に注意する。漢方製剤の併用では含有生薬の重複（特に甘草）に注意する。【禁忌】・インターフェロンを投与中の患者。・肝硬変、肝癌の患者（間質性肺炎が起り、死亡等の重篤な転帰に至ることがある）。・慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm²以下の患者（肝硬変が疑われる）

【更新日】 20151202

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。