

○プロナック点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 プロムフェナクナトリウム (U) Bromfenac Sodium 【分類】 非ステロイド性抗炎症点眼剤

【単位】 ○5mL/本 (0.1%)

【常用量】 1回1~2滴

【用法】 1日2回

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 外眼部及び前眼部の炎症性疾患〔眼瞼炎、結膜炎、強膜炎(上強膜炎を含む)、術後炎症〕に用いる NSAID 点眼液

【副作用】 角膜びらん、角膜潰瘍、眼の刺激感、熱感など。

【MW】 383.17

【更新日】 20250504

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適合性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わざるものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。