

---

**△桂枝湯エキス顆粒 (45) [ツムラ] [内]**

---

**【重要度】** 【分類】漢方製剤**【単位】** △2.5g/包**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分2～3 [食前又は食間]**【透析患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【保存期腎不全患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【特徴】** 最も基本的な方剤であり、体力が衰えたときの初期の風邪に用いる。軽い発汗作用と身体を温めて悪寒や頭痛を発散する。身体を壊しやすい体質で胃腸を温め整える。感冒において葛根湯の次に用いられることもある。**【主な副作用・毒性】** 偽アルドステロン症、過敏症**【更新日】** 20220309

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。