
△キャベジンU コーワ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 メチルメチオニンスルホニウムクロライド (MMSC) methylmethioninesulfonium chloride 【分類】 消化性潰瘍・胃炎治療剤
【単位】 △25mg/錠
【常用量】 1回 25～75mg を 1日 3回
【用法】 1日 3回
【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
【特徴】 キャベツジュース中に含まれる抗潰瘍因子である。臨床的には胃血流増加作用、胃運動抑制作用、潰瘍組織の修復再生保護作用が認められている。
【副作用】 便秘、下痢など
【Tmax】 2hr (1)
【代謝】 脱炭酸され、アミノ酸に代謝される (1)
【MW】 199.70
【O/W 係数】 資料なし (1)
【更新日】 20140813

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。