

## ○ラコールNF 配合経腸用液 [内]

【重要度】★【透析患者に投与禁忌】 【分類】経腸栄養剤

【単位】○200mL・▼400mL/袋

【常用量】1200～2000mL/日 [1200～2000kcal]

【用法】経鼻チューブ、胃瘻又は腸瘻より胃、十二指腸又は空腸に1日12～24時間かけて投与 [投与速度 75～125mL/hr]

【透析患者への投与方法】腎不全用の処方ではないため、高度腎障害患者には禁忌 (1)

【その他の報告】エンシュアリキッドよりも透析患者には適用しやすい組成かもしれない (5) ビタミンA 過剰に注意 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎不全用の処方ではないため、高度腎障害患者には禁忌 (1)

【特徴】長期の栄養管理にも適した経腸栄養剤。たん白質は日本人の摂取パターンを参考に植物性たん白質の含量を高くしている。脂肪はω3 系必須脂肪酸 (α-リノレン酸) を多く含有するシソ油を配合し、エネルギー効率に優れた MCT (中鎖脂肪酸トリグリセリド) を配合。甘さを控えた味にて 200mL 製品には香料の異なる数種のフレーバーが選択できる。400mL 製品はミルクフレーバー。

【副作用】下痢、腹痛、悪心、嘔吐、過敏症など

【相互作用】ビタミン K1 (フィトナジオン 6.25 μg/100mL) を含有するためワルファリンの効果を減弱させることがある [ただし NF となりビタミン K の含有量は減少している] (1)

【備考】開封後、やむを得ず冷蔵庫内に保存する場合は 24 時間以内に使い切る

【更新日】20200805

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。