

## △当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒 (38) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】  $\Delta 2.5\text{g}/\text{包}$

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2～3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛に適用。

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症、ミオパシー、過敏症、消化器症状、肝機能障害

【吸収】

【F】

【tmax】

【Cmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【透析患者の t1/2】

【蛋白結合率】

【透析患者の蛋白結合率】

【Vd】

【透析患者の Vd】

【分布】

【MW】

【透析性】

【透析 CL】

【透析時 t1/2】

【更新日】 20151201

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。