

◎抑肝散エキス顆粒 (54) [ツムラ] [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2～3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 虚弱な体質で神経がたかぶるものの神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症に適用。

【主な副作用・毒性】 心不全、間質性肺炎、肝機能障害、傾眠、倦怠感、ミオパシー、横紋筋融解症、過敏症など

【安全性に関する情報】 フルドーズ適用、他のカリウム低下作用のある薬物との併用時、低 Alb 血症時などは特に低 K 血症のモニターが必要 (Shimada S, et al: BMJ

Open 2017 PMID: 28619768)

【吸収】

【F】

【tmax】

【Cmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【透析患者の蛋白結合率】

【Vd】

【透析患者の Vd】

【分布】

【MW】

【透析性】

【透析 CL】

【透析時 t1/2】

【備考】 レビー小体型認知症患者の幻視や精神症状を改善する (Iwasaki K, et al: J Clin Psychiatry 66:1612-1613, 2005)

【更新日】 20210118

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。