

---

**△アクアチムクリーム・△ローション [外]**

---

**【重要度】 【一般製剤名】**ナジフロキサシン **nadifloxacin** **【分類】**ニューキノロン系外用剤**【単位】**△10g/本 [1%クリーム], △20mL/本 [1%ローション]**【用法】**1日2回塗布**【透析患者への投与方法】**減量の必要なし (1)**【保存期腎不全患者への投与方法】**減量の必要なし (1)**【特徴】**アクネ菌及び表皮ブドウ球菌を含む、好気性グラム陽性菌、陰性菌及び嫌気性菌に対し抗菌力を有する外用剤。表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）に適用される。**【副作用】**そう痒感、刺激感、発赤、潮紅、丘疹、顔面の熱感、接触皮膚炎、皮膚乾燥、ほてり感**【排泄】**外用による尿中回収率0.16% (1)**【t1/2】**19.4hr (1)**【MW】**360.38**【更新日】**20121224

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。