

▼ベータブレンシン錠 [内] <製造中止>

【重要度】 <製造中止> 【一般製剤名】 ペンブトロール硫酸塩 (U) penbutolol sulfate 【分類】 β 遮断薬

【単位】 ▼10mg・20mg/錠

【常用量】 20mg/日から開始し、最大40mg/日まで

【用法】 1日2回

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (3,12)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (3,12)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 徐脈、低血圧、消化器症状、うっ血性心不全など

【F】 初回通過効果は受けない (1) 100% (U)

【tmax】 1hr (1)

【代謝】 約50%がグルクロン酸抱合体となり、他に4'-ヒドロキシ体が存在 (1)

【排泄】 尿中回収率28% (主としてグルクロン酸抱合体) で未変化体としては0% (1) 未変化体としては尿中に排泄されない (U)

【t1/2】 22hr (12) 未変化体としては1.6hr (1) 【腎不全患者のt1/2】 24hr (12)

【蛋白結合率】 95%以上 (12) 80~98% (U)

【Vd】 不明 (1)

【MW】 680.94

【透析性】 除去されない (U)

【O/W 係数】

【更新日】 20111122

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。