

◎麻黄湯エキス顆粒 (27) [ツムラ] [内]

【重要度】 【一般製剤名】麻黄湯 【分類】漢方製剤

【単位】◎2.5g/包

【常用量】7.5g/日

【用法】分2または分3 [食前または食間]

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】感冒、インフルエンザ (初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難 (における悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものに適用)

【主な副作用・毒性】偽アルドステロン症、ミオパシー、過敏症、発汗過多、動悸、肝機能障害、食欲不振など

【更新日】20150217

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。