

## ▼ミコンビ配合錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】テルミサルタン+ヒドロクロロチアジド telmisartan+hydrochlorothiazide 【分類】持続性ARB/利尿薬合剤

【単位】テルミサルタン [▼AP 40mg・▼BP 80mg] とヒドロクロロチアジド 12.5mg の配合錠

【常用量】1回1錠, 1日1回

【用法】

【透析患者への投与方法】禁忌 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】腎機能の悪化, 脱水, 高K血症等に注意し慎重投与 (1)

【特徴】テルミサルタンとヒドロクロロチアジドの合剤。ヒドロクロロチアジドは12.5mg固定。肝障害の患者にはBPは使用できない。

【主な副作用・毒性】アナフィラキシー様症状, 血管浮腫, 低K血症, 低Na血症, 腎機能障害, ショック, 低血糖など

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【透析性】

【O/W係数】

【更新日】20150824

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。