

▼ルミガン点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ビマプロスト bimatoprost 【分類】 緑内障治療薬 [プロスタグランジン F2 α 誘導体]

【単位】 ▼2.5mL/本 [0.03%]

【常用量】 1日1回, 1回1滴

【用法】 頻回使用にて効果が減弱する可能性があり, 1日1回を超えて使用しない

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 プロスタマイド受容体に作用しぶどう膜強膜流出路を介した房水排出を促進することより眼圧を下降させる。

【主な副作用・毒性】 睫毛の異常, 結膜充血, 眼瞼色素沈着, 虹彩色素沈着, 眼そう痒, 角膜びらん, 眼瞼の多毛症, 結膜浮腫, 眼の異常感, 結膜炎, 眼瞼浮腫, 霧視など

【F】 わずかに吸収される (1)

【tmax】 8min (1)

【代謝】 加水分解され活性代謝物 17-フェニルトリノルプロスタグランジン F2 α になる (1) 酸化的代謝には CYP3A4/5 が関与 (1)

【排泄】 資料なし (1)

【蛋白結合率】 9% (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 415.57

【透析性】 資料なし (1)

【O/W 係数】 資料なし (1)

【更新日】 20141220

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。