

△乙字湯エキス顆粒 (3) 「ツムラ」 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 漢方製剤

【単位】 △2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないもののキレ痔、イボ痔の症状にたいして用いられる。

【主な副作用・毒性】 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、肝障害、過敏症、消化器症状など

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【透析性】

【更新日】 20121224

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。