

▼パピロックミニ点眼液 [外]

- 【重要度】 【一般製剤名】 シクロスポリン ciclosporin 【分類】 春季カタル治療剤
- 【単位】 ▼0.4mL/本 [0.1%]
- 【常用量】 1回1滴 1日3回点眼
- 【用法】 開封時の容器破片除去のため、使用の際は最初の1～2滴は点眼せずに捨てる。使用残液は破棄する。
- 【透析患者への投与方法】 常用量 (1)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)
- 【特徴】 眼瞼結膜巨大乳頭の増殖が認められ抗アレルギー剤により十分な効果が得られないと判断した場合に使用。
- 【主な副作用・毒性】 眼刺激感、角膜びらん・角膜潰瘍、眼そう痒感、流涙、眼瞼炎、ヘルペス性角膜炎など
- 【吸収】 点眼による血中移行率 11.3%[ラット] (1)
- 【F】 通常の用法にて血中にシクロスポリンは検出されない (1)
- 【代謝】 CYP3A で代謝 (1)
- 【排泄】 尿中回収率 3% [ラット] (1)
- 【MW】 1202.61
- 【更新日】 20140820

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配付を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。