

△ディフェリンゲル [外]

【重要度】 【一般製剤名】 アダパレン (U) Adapalene 【分類】 尋常性ざ瘡治療剤

【単位】 △15g/本 [0.1%]

【常用量】 1日1回洗顔後に患部に適量を塗布

【用法】 寝る前に塗布 [朝は洗顔して良い]

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 合成レチノイン酸誘導体。レチノイン酸受容体に作用して遺伝子転写促進を誘導し、表皮の角化細胞の分化を抑制。RAR β , γ への親和性が高い。顔面以外には使用しない。

【主な副作用・毒性】 皮膚乾燥、紅斑、掻痒感、湿疹などの皮膚症状が大半。

【吸収】 血中へはほとんど移行しない (1) 皮膚からの吸収はわずか (U)

【代謝】 皮膚では代謝されない (1) CYP 酵素を阻害しない (1)

【排泄】 静注時 79%が胆汁中に排泄され、50%は腸管循環する [ラット, 24hr まで] (1) 尿中排泄率 2%未満 [マウス] (1)

【蛋白結合率】 99%以上 [リポ蛋白とアルブミン] (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 412.52

【透析性】 資料なし (1) 除去されない (5)

【O/W 係数】 資料なし (1)

【効果発現時間】 治療効果は1~2週で発現し始め、典型的な治療効果は8~12週で得られることが多い (U)

【更新日】 20220115

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。