

## ○加味逍遙散エキス顆粒 (24) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ○2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 本方は虚証体質に現れる肝障害症状、特に婦人の神経症状を伴う諸疾患に用いられる。小柴胡湯の証に似て、しかも虚症に属し、胸脇苦満の症状は軽く、疲労しやすく、種々の神経症状を伴うものを目標とする。サイコとサンシンでイライラを改善。

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症（高血圧、浮腫）、長期投与により腸間膜静脈硬化症

【備考】 甘草を含むので低カリウム血症や血圧上昇に注意する。漢方製剤の併用では含有生薬の重複（特に甘草）に注意する。

【更新日】 20210603

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。