

▼プロトピック軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 タクロリムス水和物 (U) tacrolimus hydrate 【分類】 アトピー性皮膚炎治療剤 (免疫抑制剤)

【単位】 ▼5g/本 [成人用 0.1%], ▼5g/本 [小児用 0.03%]

【常用量】 1日 1~2回患部に塗布 [5g/日まで]

【用法】 粘膜など皮膚以外の部位や外陰部には使用しない。単純塗布以外の方法で使用しない。

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 免疫抑制剤タクロリムスの外用剤でアトピー性皮膚炎に適用される。

【主な副作用・毒性】 適用部位の皮膚刺激感、そう痒感、皮膚感染症、ざ瘡様皮疹、皮膚以外の感染症など

【F】 健常皮膚では 4.7%であるが、損傷皮膚では 62.4% [ラット] (1)

【tmax】 5~6hr (1)

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 822.03

【透析性】 除去されない (1)

【O/W 係数】 1000 以上 [1-オクタノール水系] (1)

【備考】 発がんの危険性も指摘されている。

【更新日】 20180815

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。