

△ソフィア C 配合錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ノルエチステロン+メストラノール norethisterone+mestranol 【分類】 黄体・卵胞ホルモン混合製剤

【単位】 △錠 [ノルエチステロン2mg, メストラノール0.10mg/錠]

【常用量】 ■機能性子宮出血, 無月経: 1日1~2錠を7~10日間連続投与 ■月経量異常, 月経周期異常, 月経困難症: 1日1錠を月経周期第5日より約3週間連続投与 ■卵巣機能不全による不妊症: 1日1錠を月経周期第5日より約3週間連続投与

【用法】 1日1回

【透析患者への投与方法】 慎重投与 (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 慎重投与 (1)

【特徴】 脳下垂体性ゴナドトロピン (FSH, LH) の分泌を抑制。黄体ホルモンと卵胞ホルモン2種類の女性ホルモンを補充することでホルモンバランスを整え、月経量や月経周期の異常などを改善。

【主な副作用・毒性】 血栓症, アナフィラキシー様症状, 過敏症, 肝障害, Na・体液貯留など

【F】 ノルエチステロン 53% (1)

【tmax】 ノルエチステロン 2hr, メストラノール 4~8hr (1)

【代謝】 ■ノルエチステロン: 肝代謝 (1) ステロイド骨格中のA環の二重結合が還元され, 引き続き3位のketonが還元される。17 α -エチニルエストラジオールもわずかに生成 (1) ■メストラノール: 脱メチル化を受けエチニルエストラジオールに変化。エチニルエストラジオールは主として2位水酸化される (1) CYP3A4が関与 (1)

【排泄】 ■ノルエチステロン: 尿中未変化体排泄率3% (1) 主にグルクロン酸抱合体として排泄 (1) ■メストラノール: 尿中回収率22~58% (1)

【t1/2】 ノルエチステロン 5hr (1) メストラノール 40~60hr (1)

【蛋白結合率】 ノルエチステロン 61% [アルブミン] (1)

【MW】 ノルエチステロン 298.42, メストラノール 310.43

【透析性】 資料なし (1)

【OW係数】 資料なし (1)

【更新日】 20121101

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。