

△ダラシンTゲル1% [外]

【重要度】 【一般製剤名】 クリンダマイシンリン酸エステル clindamycin phosphate 【分類】 外用抗生物質製剤

【単位】 △10g/本 [藤井寺クリニック限定]

【常用量】 洗顔後に1日2回塗布

【用法】 塗布面積は必要最小限にする。

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【特徴】 プドウ球菌属, アクネ菌を原因とした化膿性炎症を伴うざ瘡に使用する。

【主な副作用・毒性】 皮膚の刺激感, 皮膚のつっぱり感, そう痒, 蕁麻疹, 接触性皮膚炎など

【MW】 504.96

【O/W 係数】

【更新日】 20141227

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。