
△柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (11) (ツムラ) [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 漢方製剤**【単位】 △2.5g/包****【常用量】 7.5g/日****【用法】 分3 [食前又は食間]****【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)****【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)****【特徴】 体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏の更年期障害、血の道症、神経症、不眠症などに適用。****【主な副作用・毒性】 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、肝機能障害、黄疸、過敏症****【F】****【tmax】****【代謝】****【排泄】****【t1/2】****【蛋白結合率】****【Vd】****【透析性】****【OW 係数】****【更新日】 20121224**

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。