

△サラジエン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ピロカルピン塩酸塩 pilocarpine hydrochloride 【分類】口腔乾燥症状改善薬

【単位】△5mg/錠

【常用量】1回5mg, 1日3回

【用法】1日3回, 食後30分以内に経口投与 [空腹時投与は避ける]

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (1) PKは腎機能低下の影響を受けない (1)

【特徴】頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改善およびシェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善に適用される。

【主な副作用・毒性】間質性肺炎, 意識消失, 頭痛, めまい, 下痢, 嘔吐, 口内炎, 心悸亢進, 鼻炎, 多汗など

【吸収】ほぼ完全に吸収 [ラット] (1) 約50%が初回通過効果を受け消失 [イヌ] (1) 尿中回収率より70%以上 (1)

【F】ヒトでのデータなし (1) ラット89%, イヌ47% (1)

【tmax】0.84hr (1)

【代謝】血漿中のエステラーゼによる加水分解と, CYP2A6による酸化的代謝を受ける (1) 主代謝物ピロカルピン酸には活性がなく, 3α水酸化体の活性はごく弱い (1)

【排泄】尿中に未変化体25%, ピロカルピン酸15%, 3α水酸化体20%が回収 [48hrまで] (1)

【CL/F】0.99±0.42L/hr/kg (1)

【t1/2】1.5hr (1)

【蛋白結合率】10%以下 (1)

【Vd/F】2.15±0.50L/kg (1)

【MW】244.72

【透析性】資料なし (1) いくらかは除去されると思われる (5)

【OW係数】資料なし (1)

【更新日】20180405

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。