

▼ヒドロクロチアジド錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ヒドロクロチアジド (U) hydrochlorothiazide 【分類】 降圧利尿剤 [サイアザイド]

【単位】 ▼12.5mg・▼25mg/錠

【常用量】 1回 25～100mg を 1日 1～2回

【用法】 1日 1～2回

【透析患者への投与方法】 無尿の患者には禁忌 (1) 【その他の報告】 通常効果がないので避ける (17)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 重篤な腎障害のある患者には慎重投与 (1) 【その他の報告】 GFR 30mL/min 未満では効果が得られないことが多く、ループ利尿剤と併用する (12) GFR>50mL/min : 12.5～50mg を 1日 1～2回, GFR 10～50mL/min : 12.5～25mg を 1日 1回, GFR 10mL/min 未満 : 効果がないことが多いので避ける (17)

【特徴】 サイアザイド系利尿薬。高血圧症、心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、薬剤性浮腫に対して用いられる。遠位尿細管に作用して尿中 Ca 排泄を低下させるため、Ca 結石の予防に効果があるかもしれない (U)

【主な副作用・毒性】 呼吸困難、発疹、白血球減少、血小板減少、黄疸、低 Mg 血症、低クロール性アルカローシス、腹痛、知覚異常、不整脈、起立性低血圧、高 Ca 血症など

【モニターすべき項目】 血糖, BUN, Cre, UA, 血圧, 血清脂質, K

【tmax】 2hr (1)

【代謝】 ほとんど代謝を受けない (11)

【排泄】 尿中回収率 61～66% [po, 24hr まで] (1)

【t1/2】 15hr (U) 10hr (1)

【蛋白結合率】 資料なし (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 297.74

【透析性】 資料なし (1)

【O/W 係数】 資料なし (1)

【効果発現時間】 2hr (U)

【効果持続時間】 6～12hr (U)

【備考】 旧販売名：ニュートライド

【更新日】 20160521

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等で確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。