

○リパクレオンカプセル・▼顆粒 [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】 パンクレリパーゼ (U) pancrelipase 【分類】 膵消化酵素補充剤
- 【単位】 ○150mg/Cap, ▼300mg/包
- 【常用量】 1回 600mg, 1日 3回食直後
- 【用法】 食直後■粉碎不可, 噛み砕き不可
- 【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
- 【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
- 【特徴】 膵消化酵素の補充剤。ブタの膵臓から精製したアミラーゼ, リパーゼ, プロテアーゼを含有する腸溶性コーティング顆粒。
- 【主な副作用・毒性】 過敏症, 便秘, 下痢, 発熱, 腹部膨満, 高血糖など
- 【安全性に関する情報】 極めて高用量のパンクレアチン製剤で, 高尿酸尿症及び高尿酸血症の可能性 (1)
- 【代謝】 消化管で作用する (1)
- 【透析性】 該当しない
- 【更新日】 20170828

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。