

◎ガスコン錠・◎ドロップ・▼散 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ジメチコン dimeticone 【分類】消化管内ガス駆除剤

【単位】◎40mg・▼80mg/錠, ▼散10%, ◎20mg/mL (ドロップ)

【常用量】■胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 : 120~240mg/日を食後又は食間の3回に分割経口投与■胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去 : 検査15~40分前に40~80mgを約10mLの水とともに経口投与■腹部X線検査時における腸内ガスの駆除 : 検査3~4日前より120~240mg/日を食後又は食間の3回に分割経口投与

【用法】分3 [食後又は食間] ■院内規約 : 腹部エコーの前日の夕食後と寝る前に3錠 (120mg) ずつ内服

【透析患者への投与方法】透析患者の投与方法に言及した文献はないが、吸収されないため減量する必要はない (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎不全患者の投与方法に言及した文献はないが、吸収されないため減量する必要はない (5)

【特徴】胃腸内に無数に存在する小さなガス気泡の表面張力を低下させ、遊離気体に合体させる。この後腸内ガスは血液に吸収 (有機ガス) されやすくなり、欠伸、放屁となって対外へ排出されやすくなる (空気、無機ガス)。このほか胃腸の不定愁訴を改善し緩下作用も有する。また胃腸内視鏡およびX線による観察を容易にする。

【主な副作用・毒性】下痢、腹痛、嘔吐、食欲不振、頭痛など

【吸収】吸収されない (1)

【排せ】吸収されずに未変化体のまま糞便中に排せ (1)

【MW】高分子

【透析性】吸収されないので該当しない (1)

【更新日】20140825

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。