

▼オスポロット錠 [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】 スルチアム Sultiame 【分類】 抗てんかん剤 [精神運動発作治療薬]
- 【単位】 ▼50mg・▼200mg/錠
- 【常用量】 200～600mg/日
- 【用法】 1日2～3回
- 【透析患者への投与方法】 設定されていない (1)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 腎障害のある患者では腎不全を起こすことがあるため投与禁忌 (1)
- 【特徴】 精神運動発作に適用され、鎮静・催眠作用が弱く、精神状態や行動能力への影響が少ない。
- 【主な副作用・毒性】 腎不全、過敏症、白血球減少、貧血、眠気、めまい、運動失調、消化器症状など
- 【F】 資料なし (1)
- 【tmax】 2～4hr (1)
- 【代謝】 2種の代謝物が検出されている (1) CYP の関与は不明 (1)
- 【排泄】 尿中回収率 32% [po, 24hr まで] (1)
- 【t1/2】 6hr (1)
- 【蛋白結合率】 44.6% (1)
- 【Vd】 不明 (1)
- 【MW】 290.36
- 【透析性】 資料なし (1)
- 【TDM のポイント】 有効濃度 8～15 μ g/mL (1) 赤血球内濃度 45 μ g/mL で動悸、呼吸促進、四肢しびれ感、知覚異常が認められている (1)
- 【O/W 係数】 資料なし (1)
- 【更新日】 20230318

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。