

◎強力ポステリザン軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】特徴参照 【分類】痔疾治療剤

【単位】◎2g/本

【用法】1日1～3回、適量を患部に塗布又は注入

【透析患者への投与方法】常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (5)

【特徴】1個2g中、大腸菌死菌浮遊液0.326mL(大腸菌死菌約3.3億個)、ヒドロコルチゾン5mg含有。大腸菌死菌浮遊液には白血球遊走能の促進作用やマクロファージの集積効果がみられ、大腸菌局所感染に対して抵抗性を高め、局所感染防御作用を示す。肉芽形成促進作用もある。ヒドロコルチゾン配合により抗炎症作用もある。

【主な副作用・毒性】かゆみ、適用部位不快感、眼圧亢進、過敏症、皮膚感染症

【更新日】20150107

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。