

▼ムコスタ点眼液 UD [外]

【重要度】 【一般製剤名】 レバミピド rebamipide 【分類】 ドライアイ治療剤 [ムチン産生促進剤]

【単位】 ▼0.35mL/本 [2%]

【常用量】 1回1滴, 1日4回

【用法】 点眼 [懸濁液であり, 使用前に分散させる]

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 涙液異常に伴う角結膜上皮障害が認められるドライアイに使用

【主な副作用・毒性】 苦味, 眼刺激感, 眼そう痒, 霧視, 過敏症, 涙道閉塞, 涙嚢炎, 消化器症状など

【安全性に関する情報】 眼表面, 涙道等に成分が凝集することがある (1)

【代謝】 CYP3A4 で8-水酸化体が生成 (1)

【排泄】 尿中回収率 4% [点眼] (1)

【更新日】 20151119

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。