

▼アレリックス錠 [内]・▼注 [注] <販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】ピレタニド pirtanide 【分類】ループ利尿剤

【単位】▼3mg・▼6mg/錠, ▼6mg/A [2mL]

【常用量】■錠：3～6mg/日から開始, 最大12mg/日

■注：6～12mgを1日1回静注

【用法】■錠：1日1～2回

■注：1日1回

【透析患者への投与方法】無尿の患者には禁忌 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】排泄が遅延するため慎重投与 (1)

【特徴】フロセミドの誘導体。腎ネフロンへのヘンレ係蹄上行脚においてナトリウム及びクロールの再吸収を抑制し利尿作用を発現。

【主な副作用・毒性】脱力感、倦怠感、低K血症、血小板減少、低Ca血症、過敏症、口渇、悪心、下痢、めまい、低血圧など

【F】80% (1)

【tmax】0.74hr (1)

【代謝】代謝を受けにくい (1)

【排泄】尿中回収率82% [iv, 24hrまで] (1)

【t1/2】0.74hr (1)

【蛋白結合率】95%、腎不全86% (1)

【Vd】

【MW】362.40

【透析性】除去されないと考えられる (1)

【O/W係数】資料なし (1)

【更新日】20170408

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。