

---

△ラミシールクリーム・▼外用液・▼外用スプレー [外]

---

【重要度】 【一般製剤名】テルビナフィン塩酸塩 terbinafine hydrochloride 【分類】アリルアミン系抗真菌剤

【単位】△10g/本 [1%]・▼10g/本 [1%液]

【用法】1日1回患部に塗布

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】アリルアミン系抗真菌剤。皮膚糸状菌に対して殺真菌作用を有し、従来のアゾール系の抗真菌剤と異なりスクアレニエポキシダーゼを選択的に阻害してスクアレニの蓄積並びにエルゴステロール含量の低下をもたらす抗真菌作用を示す。

【主な副作用・毒性】重過敏症、皮膚炎など

【吸収率】推定される経皮投与における吸収率は約5% (1)

【排泄】塗布後わずかに吸収されたテルビナフインは主に尿中排泄される。0.04mg/kgを単回塗布し、11日間累積の排泄率は尿中3.64%および糞中0.65% (1)

【MW】327.90

【更新日】20180711

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。