

○フルカリック輸液 [注]

【重要度】★【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】 【分類】高カロリー輸液配合剤

【単位】○1号 [903mL]・○2号 [1003mL]・○3号 [1103mL]

【常用量】1日1～2袋

【用法】中心静脈内に24hr点滴

【透析患者への投与方法】透析患者用の配合ではない(1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎不全用の配合ではない(1)

【特徴】高カロリー輸液でブドウ糖, アミノ酸, 総合ビタミンの配合輸液. 混合して使用する. 遮光カバーをつける.

【主な副作用・毒性】ショック, アシドーシス, 高血糖, 電解質異常, 消化器症状, 肝機能障害, 腎機能障害, 血管痛など

【更新日】20170121

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。