

◎キシロカインポリアンプ [注]

【重要度】 【一般製剤名】 リドカイン塩酸塩水和物 (U) lidocaine hydrochloride monohydrate 【分類】 局所麻酔剤

【単位】 ◎1%, ◎2% [1本 10mL]

【常用量】 1回最大量は200mg [1%液 20mL, 2%液 10mL]

【用法】 硬膜外麻酔：100～200mg, 伝達麻酔：30～200mg, 指趾神経遮断：30～100mg, 肋間神経遮断には50mgまで, 浸潤麻酔：20～200mg, 表面麻酔：塗布又は噴霧

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (3)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (3)

【特徴】 保存剤を含有しない一回使用を目的とした製剤。局所の浸潤性がよく、効果が確実。表面麻酔から脊椎麻酔まで全ての局所麻酔剤に用いられるが、血管拡張作用により吸収が早く、血中濃度が上がりやすい。

【副作用】 ショック, 意識障害, 振戦, 痙攣, 悪性高熱, 眠気, 不安, 悪心・嘔吐, 皮疹など

【代謝】 CYP1A2, 3A4 で代謝 (1)

【MW】 288.81

【更新日】 20121018

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。