

◎キシロカインビスカス [内]

【重要度】 【一般製剤名】 リドカイン (U) lidocaine 【分類】 経口表面麻酔剤

【単位】 ◎mL [2%]

【常用量】 1回 5～15mL [添付のさじで1～3杯]

【用法】 ■内視鏡検査 [咽喉頭・食道部の麻酔：一気に嚥下することなく徐々に飲み込ませる] ■口腔内麻酔：不必要部の麻酔を避ける目的で嚥下させることなく、口腔内に拡げただけにとどめさせる ■胃部麻酔 [ダンピング症候群、幽門痙攣等]：速やかに嚥下させ、コップ半分の水で洗い落とさせる

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (3)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (3)

【特徴】 内視鏡検査その他咽喉頭、食道部の麻酔、口腔内検査、胃部麻酔剤に使われる。

【主な副作用・毒性】 ショック、意識障害、振戦、痙攣、眠気、不安、興奮、霧視、悪心・嘔吐、皮膚過敏症など

【MW】 234.34

【効果持続時間】 15～20分 (U)

【更新日】 20150114

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。