

## ▼シダトレンスギ花粉舌下液 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

【単位】 ▼200JAU/ボトル, ▼2000JAU/ボトル

【常用量】 成人及び12歳以上の小児が治療対象 ■増量期（1～2週目）：1週目は200JAU/mLボトルを、2週目は2,000JAU/mLボトルを使用して徐々に増量 [添付文書参照] ■維持期（3週目以降）：2,000JAU/mLパックの全量1mLを1日1回使用

【用法】 ■1日1回舌下に滴下し、2分間保持した後、飲み込む。その後5分間はうがい・飲食を控える

【透析患者への投与方法】 特に指定されていない (1)

【保存期 CKD患者への投与方法】 特に指定されていない (1)

【特徴】 標準化スギ花粉エキス原液を用いた減感作療法。

【主な副作用・毒性】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W係数】

【更新日】 20190311

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。