

## ▼ペントナ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 マザチコール塩酸塩水和物 mazaticol hydrochloride hydrate 【分類】 薬剤性パーキンソン症候群治療剤

【単位】 ▼4mg/錠

【常用量】 12mg/日

【用法】 1日3回

【透析患者への投与方法】 データがないが、代謝物に活性がなければ減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 データがないが、代謝物に活性がなければ減量の必要なし (5)

【特徴】 向精神薬投与によるパーキンソン症候群に適用される中枢性抗コリン剤。末梢性抗コリン作用（散瞳、口渇等）は弱い。

【主な副作用・毒性】 悪性症候群、幻覚、脱力感、焦燥、不安感、不穏、妄想、めまい・ふらつき・立ちくらみ、頭痛、不眠、眠気、知覚異常、発汗、口渇、悪心・嘔吐、便秘、食欲不振、排尿困難、霧視、視調節障害、鼻閉、不整脈など。

【安全性に関する情報】 高齢者ではせん妄、不安等の精神症状及び抗コリン作用によるめまい、立ちくらみ、口渇等があらわれやすいので減量するなど注意 (1)

【F】 資料なし (1)

【tmax】 3～5hr [イヌ] (1)

【代謝】 代謝されて尿中に排泄 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 0.1% [ラット] (1) 尿中回収率 60% [イヌ] (1)

【t1/2】 資料なし (1)

【蛋白結合率】 資料なし (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 460.05

【透析性】 資料なし (1)

【O/W 係数】 資料なし (1)

【相互作用】 抗コリン作用を有する薬剤との併用注意 (1)

【更新日】 20160130

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。