

▼ベピオゲル [外]

【重要度】 【一般製剤名】 過酸化ベンゾイル benzoyl peroxide 【分類】 尋常性ざ瘡治療剤

【単位】 ▼15g/本

【常用量】

【用法】 1日1回, 洗顔後, 患部に適量を塗布

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】 他の外用剤と併用する場合は, 皮膚刺激症状が増すおそれがあるため注意 (1) 眼, 口唇, その他の粘膜及び傷口に使用しない. これらの部位に本剤が付着した場合には直ちに水で洗い流す (1)

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 242.23

【透析性】

【O/W 係数】

【相互作用】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20150818

※正確な情報を掲載するように努力していますが, その正確性, 完全性, 適切性についていかなる責任も負わず, いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし, それらを利用した結果,

直接または間接的に生じた一切の問題について, 当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は, 日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。