

## ▼サントニン原末 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 サントニン santonin 【分類】 回虫駆除薬

【単位】 ▼g

【常用量】 1回量は6歳未満20mg, 6~12歳未満40~80mg, 12歳以上100mg

【用法】 1日2回空腹時,あるいは寝る前1回,翌朝1回経口投与

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 虫体のリン酸・糖代謝及び酸化機能の阻害などによる駆虫作用を有する。排虫は経口投与翌日から始まり, 2~3日後に最高となり5~7日後にはほぼ終了する。

【主な副作用・毒性】 腹痛, 悪心, 下痢, 頭痛, めまい, 一過性黄視など

【F】

【tmax】

【代謝】 資料なし (1)

【排泄】 尿中回収率18.9% [po, 24hrまで] (1)

【t1/2】 資料なし (1)

【蛋白結合率】 資料なし (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 246.30

【透析性】 資料なし (1)

【O/W係数】

【相互作用】 油性下剤と併用禁忌 (1)

【肝障害患者への投与方法】 肝障害患者には禁忌 [肝障害悪化のおそれ] (1)

【主な臨床報告】

【更新日】 20150701

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。