

▼イサロン錠・▼顆粒 [内]

【重要度】★★【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】アルジオキサ aldioxa 【分類】胃炎・消化性潰瘍治療剤

【単位】▼100mg/錠, ▼25%顆粒, ▼50%顆粒

【常用量】300～400mg/日

【用法】1日3～4回

【透析患者への投与方法】Alを含有するため禁忌 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】腎障害のある患者では長期投与によりAl脳症, Al骨症があらわれるおそれがあるので, 定期的に血中Al, IP, Ca, ALP等の測定を行う (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】便秘

【F】資料なし (1)

【tmax】消化管内でアラントインと水酸化アルミニウムに加水分解され, アラントインの大部分は吸収されtmax0.5～1hr (1)

【代謝】消化管内でアラントインと水酸化アルミニウムに加水分解される (1) 吸収したアラントインは, アラントイン酸, ヒダントイン酸, 尿素等に代謝 [ラット] (1)

【排泄】資料なし (1)

【t1/2】資料なし (1)

【蛋白結合率】資料なし (1)

【Vd】資料なし (1)

【MW】

【透析性】資料なし (1)

【O/W係数】資料なし (1)

【相互作用】テトラサイクリン, ニューキノロンの吸収阻害 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20150811

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。