

## ▼ザガーロカプセル [内]

【重要度】 【一般製剤名】デュタステリド dutasteride 【分類】男性型脱毛症治療薬 [5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬]

【単位】 ▼0.1mg・▼0.5mg/cap

【常用量】 通常 0.1mg/日, 必要に応じて 0.5mg/日

【用法】 1日1回

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 肝機能障害, 黄疸, 発疹, かゆみ, 頭痛, めまい, 性機能不全, 味覚異常, 女性化乳房, 精巣痛, 体毛の脱落, 多毛, 消化器症状など

【安全性に関する情報】 本剤は経皮吸収されるため, 女性や小児はカプセルから漏れた薬剤に触れない (1)

【F】

【tmax】

【代謝】 CYP3A4 で代謝 (1)

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【相互作用】 CYP3A4 阻害剤との併用注意 (1)

【肝障害患者への投与方法】 重度の肝障害患者には禁忌 (1)

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【備考】 20歳未満での安全性及び有効性は確立されていない (1) 6か月で効果判定 (1)

【更新日】 20180409

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。