

▼ルシドロール錠 [内] <販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】メクロフェノキサート塩酸塩 Meclofenoxate Hydrochloride 【分類】中枢神経筋活剤

【単位】▼100mg

【常用量】300～900mg/日

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】設定されていない (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】設定されていない (5)

【特徴】脳幹網様体を介する賦活作用（ウサギ）、抗低酸素作用（マウス、ラット）があり、頭部外傷後遺症におけるめまいに適用される。

【主な副作用・毒性】発疹、不眠、頭痛、興奮、痙攣、食欲不振、肝機能検査値異常など

【tmax】2.1hr (1)

【代謝】加水分解される (1)

【排泄】尿中回収率85%でほとんど代謝物バラクロルフエノキシ酢酸 [po, 24hr まで] (1)

【CL】資料なし (1)

【t1/2】8.4hr (1)

【蛋白結合率】資料なし (1)

【Vd】資料なし (1)

【MW】294.17

【透析性】資料なし (1)

【O/W 係数】資料なし (1)

【備考】4週間投与しても効果が認められない場合は中止 (1)

【更新日】20241007

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。