

◎ブドウ糖注 50%PL [注]

【重要度】 【一般製剤名】ブドウ糖 glucose 【分類】ブドウ糖補給剤

【単位】◎20mL/A

【常用量】非経口的な水・エネルギー補給：1回10～50%液を20～500mL点滴静注

【用法】点滴速度はブドウ糖として0.5g/kg/hr以下

【透析患者への投与方法】減量の必要なし（5）

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし（5）

【特徴】ブドウ糖補給目的にそのままあるいは輸液製剤に混合して用いる。静脈内注射されたブドウ糖が利用される時、血中Kの細胞内への移行が起こり血清K値が低下するため、高K血症の治療にも用いられる。

【主な副作用・毒性】血栓性静脈炎、血清K低下、高血糖など

【MW】180.16

【更新日】20140505

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。