

▼マードュオックス軟膏 [外]

【重要度】★★ 【一般製剤名】マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル maxacalcitol/betamethasone butyrate propionate 【分類】

尋常性乾癬治療剤

【単位】▼10g/本 [マキサカルシトール 0.0025%, ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05%]

【常用量】1日1回適量を塗布 [最大10g/日]

【用法】

【透析患者への投与方法】 活性型ビタミンDを含有するため要注意 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 活性型ビタミンDを含有するため要注意 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 高Ca血症, 急性腎不全, 皮膚の刺激感, 発疹, ステロイド性皮膚障害, 毛のう炎, 皮膚の感染症, 尿路結石など

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【相互作用】 活性型ビタミンD, PTH 製剤, Ca 製剤による高Ca血症に注意 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20161210

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。