

◎ブドウ糖注 5%500mL [注]

【重要度】 【一般製剤名】ブドウ糖注射液 glucose 【分類】輸液製剤 [ブドウ糖]

【単位】◎500mL/瓶

【常用量】水欠乏性脱水時の水補給, 薬物・毒物中毒, 肝疾患: 1回 500~1000mL

【用法】ブドウ糖として0.5g/kg/hr以下の速度で点滴静注

【透析患者への投与方法】水分負荷を考慮して投与 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】水分負荷を考慮して投与 (5)

【特徴】主として水分補給 (自由水補給) 目的で用いられる。

【主な副作用・毒性】血清 K 低下, 糖尿病患者で高血糖, 腎不全患者で水過剰

【更新日】20150110

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。