

## ◎ブドウ糖注 20%PL 20mL [注]

【重要度】 【一般製剤名】ブドウ糖 glucose 【分類】栄養補給薬

【単位】◎20mL/A

【常用量】■経口的に水・エネルギー補給を必要とする場合：1回10～50%液、20～500mLを静注■注射剤の希釈溶解には適量

【用法】点滴静注速度はブドウ糖として0.5g/kg/hr以下

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【特徴】静注鉄剤 [フェジン静注] の希釈に使用。

【主な副作用・毒性】血清 K 低下, 糖尿病患者で高血糖, 腎不全患者で水中毒

【MW】180.16

【更新日】20140505

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。