

## ▼モンビル皮下注 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 プレリキサホル plerixafor 【分類】 CXCR4 ケモカイン受容体拮抗剤

【単位】 ▼24mg/V [1.2mL]

【常用量】

【用法】

【透析患者への投与方法】 設定されていない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 Ccr<50：減量考慮 [血中濃度上昇の報告あり] (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】 0.5～1.0hr (1)

【代謝】 代謝を受けない (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率約 70% [sc, 24hr まで] (1)

【CL/F】 4.47L/hr [sc] (1)

【t1/2】 6hr (1)

【蛋白結合率】 37.0～58.0% (1)

【Vd/F】 38.0～40.3L/man [sc] (1)

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20190115

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。