

▼イストダックス点滴静注用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】ロミデプシン romidepsin 【分類】抗悪性腫瘍剤 [HDAC 阻害剤]

【単位】▼10mg/V

【常用量】「1回14mg/m² [適宜減量]を1, 8, 15日目に点滴静注後、休薬(16~28日目)する」を1サイクルとして投与を繰り返す

【用法】4時間かけて点滴静注

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】CYP3A4により代謝 (1)

【排泄】尿中回収率0.5%未満 [iv, 24hr まで] (1) P-gpの基質 (1)

【CL】9.31L/hr [iv] (1)

【t1/2】9hr (1)

【蛋白結合率】92~94% [主にAAG] (1)

【Vd】122~196L/man (1)

【MW】540.70

【透析性】資料なし (1) 除去されないと思われる (5)

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20180403

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。