

## ▼アレサガテープ [外]

【重要度】 【一般製剤名】 エメダスチンフマル酸塩 Emedastine Fumarate 【分類】 抗ヒスタミン剤 [H1-blocker]

【単位】 ▼4mg・▼8mg/枚

【常用量】 1回 4mg [最大 8mg]

【用法】 1日1回 (24hr 毎に貼り替え) 胸部, 上腕部, 背部, 腹部のいずれかに貼付 ■開封後は速やかに貼付

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 適用部位の皮膚異常, 眠気など

【安全性に関する情報】 8mg 使用時に眠気の発現率が高い (1)

【F】

【tmax】 26hr (1)

【代謝】 CYP1A2, 2E1, 3A4 が関与 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 2.9~4.4% [24hr 胸部に貼付, 96hr まで] (1)

【t1/2】 13hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20200616

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。