

◎バリコンミール [内]

【重要度】 【一般製剤名】硫酸バリウム barium sulfate 【分類】胃二重造影用X線造影剤

【単位】◎300g/袋

【常用量】100g に対し水 18～26mL を加えて 200W/V%～240W/V%の濃度の懸濁液としその適量を経口投与

【用法】経口投与

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】ショック、アナフィラキシー、過敏症、排便困難、便秘、一過性の下痢・腹痛、肛門部痛・出血、悪心、嘔吐など

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【MW】233.39

【透析性】該当しない (5)

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20180409

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。