

▼サチユロ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ベダキリンフマル酸塩 bedaquiline fumarate 【分類】 抗結核化学療法剤

【単位】 ▼100mg/錠

【常用量】 投与開始から2週間：1日1回400mg■3週目以降は1回200mg、週3回

【用法】 食直後■他の抗結核薬と併用

【透析患者への投与方法】 データはないが、減量の必要はないと思われる (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 PKは腎機能低下の影響を受けない (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 QT延長、肝機能障害、頭痛、めまい、消化器症状、関節痛、筋肉痛

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】 CYP3A4で代謝 (1)

【排泄】 主に糞便中に未変化体として排泄 [排泄量の75~85%が未変化体] (1) 尿中にはほとんど回収されない (1)

【t1/2】 約1週間 (1)

【蛋白結合率】 99%以上 (1)

【Vd】

【MW】 671.58 [salt]

【透析性】

【OW係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20190128

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。